

Myopie-Management ist bei CooperVision Teil der Unternehmensstrategie

Wie aus einer Linse ein Konzept wurde

LITERATURVERZEICHNIS

- [1] Anstice NS, Phillips JR. Effect of Dual-Focus Soft Contact Lens Wear on Axial Myopia Progression in Children. *Ophthalmology*. 2011;118(6):1152–1161. doi:10.1016/j.ophtha.2010.10.035.
- [2] Cho P, Cheung SW, Edwards M. The longitudinal orthokeratology research in children (LORIC) in Hong Kong: a pilot study on refractive changes and myopic control. *Current Eye Research*. 2005;30(1):71–80. doi:10.1080/02713680590907256.
- [3] Chamberlain P, Peixoto-de-Matos SC, Logan NS, Ngo C, Jones D, Young G. A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. *Optometry and Vision Science*. 2019;96(8):556–567. doi:10.1097/OPX.0000000000001410.
- [4] Chamberlain P, Lazon de la Jara P, Arumugam B, Bullimore MA. Axial length targets for myopia control. *Ophthalmic & Physiological Optics*. 2021;41(3):523–531. doi:10.1111/opo.12812.
- [5] Chamberlain P, Bradley A, Arumugam B, et al. Long-term Effect of Dual-focus Contact Lenses on Myopia Progression in Children: A 6-year Multicenter Clinical Trial. *Optometry and Vision Science*. 2022;99(3):204–212. doi:10.1097/OPX.0000000000001873. Für die Siebenjahresdaten gibt es zusätzlich die 2025 publizierte Follow-up-Arbeit Eye growth and myopia progression following cessation of myopia control therapy with a dual-focus soft contact lens. Sie untersucht das siebte Studienjahr nach Beendigung der MiSight-Therapie.
- [6] Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG), Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA), Bielschowsky-Gesellschaft. Empfehlungen bei progredienter Myopie im Kindes- und Jugendalter. Stellungnahme, 2022.